

*Research Article***Effects of soybean meal-free (corn-based) diets on performance, immune response and hematological parameters of broiler chickens****Mohammad Ali Behrooz Lak ^{*1}, Seyed Adel Mofstakharzadeh ¹, Seyed Abdullah Hosseini ¹, Ruhollah Kianfar ², Shahrooz Khorrami ¹**¹ Animal Science Research Institute of Iran, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Karaj, Iran² Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran**Key Words**Corn-based diet
Broiler chicken
Performance
Abdominal fat
Hematological parameters**Abstract****Introduction:** This experiment was conducted to evaluate the effects of a corn-based diet free of soybean meal on the performance, immune response, and hematological parameters of broiler chickens from 21 to 42 days of age.**Materials & Methods:** A total of 400 one-day-old Ross 308 broiler chicks were allocated to two treatments with 5 replicates per treatment and 40 chicks per replicate. The experimental treatments consisted of a corn-based diet free of soybean meal and a conventional corn-soybean meal-based diet (as control). To evaluate humoral immune responses, antibody levels produced in response to Newcastle and influenza vaccine injections were measured. Additionally, hematological blood parameters of the chicks were examined.**Results:** The performance traits showed that the live body weight and feed intake of broiler chickens fed the corn-based diet were lower than those fed the control diet (corn-soybean meal) ($P < 0.01$). On day 42 of the trial, the feed conversion ratio and production efficiency index of birds fed the control diet improved compared to those fed the corn-based diet ($P < 0.05$). Furthermore, carcass characteristics indicated that broilers fed the corn-based diet had a lower breast yield compared to the control group ($P < 0.05$). The relative weight of abdominal fat was lower in birds fed the corn-based diet compared to the control ($P < 0.05$). Hematological parameters revealed significant differences between the two groups in white blood cell count, hemoglobin concentration, heterophils, lymphocytes, and the heterophil-to-lymphocyte ratio, with birds fed the corn-based diet showing altered values compared to the control ($P < 0.05$).**Conclusion:** The overall results of this experiment indicated that despite the reduced performance observed in birds fed the corn-based diet, the use of this diet may positively contribute to improving bird health through reducing abdominal fat deposition and enhancing hematological parameters.**Article info*** Corresponding Author's email:
behrouz.lak@gmail.com

Received: 13 June 2025

Reviewed: 15 July 2025

Revised: 16 September 2025

Accepted: 18 October 2025

مقاله علمی - پژوهشی

اثرات جیره‌های فاقد کنجاله سویا (بر پایه ذرت) بر عملکرد، پاسخ ایمنی و فراسنجه‌های هماتولوژیکی جوجه‌های گوشتی

محمدعلی بهروزی لک^{*}، سید عادل مفتخرزاده^۱، سید عبدالله حسینی^۱، روح‌اله کیانفر^۲، شهروز خرمی^۱

^۱ موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

^۲ گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

کلمات کلیدی

جیره مرغ ذرت

جوجه گوشتی

عملکرد

چربی محوطه بطنی

فراسنجه‌های هماتولوژیکی

مقدمه: این آزمایش به منظور ارزیابی اثرات استفاده از جیره تهیه شده با بر پایه ذرت و فاقد کنجاله سویا بر عملکرد، پاسخ ایمنی و فراسنجه‌های هماتولوژیکی جوجه‌های گوشتی از سن ۲۱ تا ۴۲ روزگی انجام شد.

مواد و روش‌ها: تعداد ۴۰۰ قطعه جوجه گوشتی یک‌روزه سویه راس ۳۰۸ در قالب دو تیمار با ۵ تکرار و ۴۰ قطعه جوجه در هر تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل: جیره فرموله شده بر پایه ذرت و فاقد کنجاله سویا و جیره متداول بر پایه ذرت-کنجاله سویا (شاهد) بودند. برای بررسی پاسخ‌های ایمنی همورال میزان آنتی بادی تولید شده در پاسخ به تزریق واکسن نیوکاسل و آنفولانزا استفاده شد و هم‌چنین شاخص‌های هماتولوژیکی خون جوجه‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج: نتایج صفات عملکرد نشان داد که وزن زنده و میزان مصرف خوراک جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره مرغ ذرت در مقایسه با جیره شاهد پایین‌تر بود ($P < 0/01$). هم‌چنین در سن ۴۲ روزگی، ضریب تبدیل خوراک و شاخص تولید پرندگان تغذیه شده با جیره شاهد (جیره معمول ذرت-کنجاله سویا) در مقایسه با جیره مرغ ذرت بهبود یافت ($P < 0/05$). نتایج خصوصیات لاشه نشان داد که جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره مرغ ذرت در مقایسه با جیره شاهد راندمان سینه پایین‌تری داشتند ($P < 0/05$). به علاوه، وزن نسبی چربی محوطه بطنی نشان در پرندگان تغذیه شده با جیره مرغ ذرت در مقایسه با جیره شاهد پایین‌تر بود ($P < 0/05$). نتایج فراسنجه‌های هماتولوژیکی نشان داد که مقادیر گلبول‌های سفید خون، هموگلوبین، هتروفیل‌ها و لنفوسیت‌ها و نسبت هتروفیل به لنفوسیت در پرندگان تغذیه شده با جیره مرغ ذرت در مقایسه با پرندگان شاهد اختلاف معنی‌داری را نشان دادند ($P < 0/05$).

بحث و نتیجه‌گیری: نتایج کلی این آزمایش نشان داد که با وجود کاهش عملکرد پرندگان تغذیه شده با جیره مرغ ذرت، استفاده از این جیره می‌تواند با کاهش چربی محوطه بطنی و بهبود فراسنجه‌های هماتولوژیکی در بهبود وضعیت سلامت پرندگان مؤثر باشد.

* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

behrouz.lak@gmail.com

تاریخ دریافت: ۲۳ خرداد ۱۴۰۴

تاریخ داور: ۲۴ تیر ۱۴۰۴

تاریخ اصلاح: ۲۵ شهریور ۱۴۰۴

تاریخ پذیرش: ۲۶ مهر ۱۴۰۴

مقدمه

با توجه به کمبود منابع پروتئینی و وابستگی آن به واردات و هزینه‌های بالای مرتبط با آن، توجه محققین به یافتن منابع جایگزین قابل استفاده در جیره طیور به‌عنوان جایگزین کل یا بخشی از منابع پروتئین جیره افزایش یافته است. کنجاله سویا اگرچه دارای کیفیت بالایی است ولی قیمت و نوسانات قیمت، پرورش‌دهندگان را به سمت استفاده از دیگر اقلام جایگزین در دسترس و ارزان‌تر هدایت کرده است. از طرف دیگر مصرف‌کنندگان نگران محصولات تراریخته وارداتی نیز هستند. بنابراین برای جایگزینی کنجاله سویا با منابع محلی و ارزان قیمت پژوهش‌های زیادی انجام شده و یا در حال انجام است. کنجاله سویا و ذرت بخش عمده جیره طیور را تشکیل داده و به‌ترتیب رایج‌ترین مواد تأمین‌کننده پروتئین و انرژی در جیره غذایی طیور در سطح جهان هستند (۱، ۲). ذرت به‌دلیل انرژی بالا، فیبر کم، خوش طعم بودن و وجود رنگدانه‌ها و اسیدهای چرب ضروری در اولویت است. با این وجود، محتوای پروتئین دانه ذرت در مقایسه با دیگر غلات کم است (۳). در کشورهای مختلف، ذرت به‌دلیل محتوای بالای انرژی موجود در خوراک طیور استفاده می‌شود. ذرت می‌تواند حدود ۶۵ درصد از انرژی قابل متابولیسم ظاهری (AME: Apparent Metabolisable Energy) و ۲۰ درصد از پروتئین خام (CP: Crude Protein) جیره جوجه‌های گوشتی را تأمین کند (۴). ارزش غذایی ذرت در جیره جوجه‌های گوشتی با ترکیب شیمیایی و ویژگی‌های فیزیکی آن تعیین می‌شود (۵). با این وجود، محتوای آن نشاسته (۶۷-۷۶ درصد ماده خشک)، پروتئین (۱۱/۸-۷/۹ درصد ماده خشک)، روغن (۷/۵-۳/۷ درصد ماده خشک، اسیدهای آمینه (لیزین: ۲/۹۸ تا ۴/۸۹ درصد پروتئین خام و متیونین: ۱/۶۴-۰/۸۳ درصد پروتئین خام و پلی‌ساکاریدهای غیرنشاسته‌ای (۸۱/۳-۵۵/۶ گرم بر کیلوگرم) متغیر است و تحت تأثیر پس‌زمینه ژنتیکی، شرایط رشد، فرآوری پس از برداشت و شرایط نگهداری است (۶). آرد یا کنجاله گلوتن ذرت (CGM: Corn gluten meal) فرآورده فرعی تولید شربت ذرت و یا نشاسته است که پس از جداسازی پوسته، جوانه و نشاسته به دست می‌آید. این محصول یک افزوده پروتئینی است که برای خوراک دام و طیور کاربرد دارد (۷). آرد گلوتن ذرت بهترین منبع پروتئینی است که مقدار پروتئین آن ۶۰ درصد ماده خشک بوده و غنی از اسیدآمینه‌های گوگردی است که در بسیاری از انواع گونه‌های حیوانات اهلی قابلیت هضم بالایی دارد (۸). کنجاله گلوتن ذرت یک منبع غنی و با قابلیت دسترسی بالایی از متیونین برای طیور است (۹). مقدار انرژی قابل متابولیسم حقیقی تصحیح شده براساس ازت کنجاله گلوتن ذرت ۳۸۱۱ کیلوکالری در کیلوگرم و مقدار انرژی خام آن

۵۴۶۷ کیلوکالری در کیلوگرم است که با توجه به نوع و رقم ذرت می‌تواند متفاوت باشد (۳). کنجاله گلوتن ذرت غنی از ویتامین E، کاروتنوئید و گزانتوفیل است و قابلیت هضم آن بالای ۹۰ درصد است. مقدار کاروتنوئیدها در کنجاله گلوتن ذرت ۲۲۴-۵۵۰ میلی‌گرم در کیلوگرم بر پایه ماده خشک است (۹). با توجه به گسترش مصرف مرغ در کشور و اهمیت فواید استفاده از مرغ سایز و مرغ سالم، ضرورت بررسی تولید فرآورده‌های متنوع گوشت مرغ با تکیه بر کیفیت گوشت تولیدی با جایگزین کردن سیستم‌های پرورشی به صورت پرورش مرغ‌های گوشتی ارگانیک و پرورش‌یافته در مرتع (Pasture-raised) وجود دارد. محصولات پروتئینی ارگانیک نسبت به محصولات گوشتی رایج در بازار سالم‌تر بوده و از لحاظ حالت حسی طعم و مزه گوشت، خوش طعم‌تر و بازاریاب‌پسندتر هستند (۱۰). لذا با توجه به تحقیقات انجام شده بر روی جوجه‌های گوشتی با استفاده از جیره مرغ ذرت، جوجه‌های گوشتی ارگانیک و جوجه‌های پرورش یافته در محیط آزاد (Free range-raised) نتایج نشان داده است که برخلاف جوجه‌های گوشتی تجاری، این جوجه‌ها با توجه به شرایط آسایش و رفاهی که در طول دوران پرورش خود دارند از کیفیت گوشت سینه و بازاریاب‌پسندی عمومی بیش‌تری برخوردار هستند. در کشورهای نظیر انگلستان و ایرلند شمالی سود حاصل از فروش این فرآورده‌های پروتئینی حاصل از مرغ ذرت، مرغ ارگانیک و مرغ free-range مراکز خرید تجاری به‌ترتیب حدود ۴۳ و ۵۳٪ بیش‌تر از فرآورده‌های رایج و مرسوم موجود در بازار بود (۱۱). نتایج مطالعات اخیر نشان داده‌اند که گوشت و پوست پرنده تغذیه شده با مرغ ذرت به لحاظ ظاهری زردتر بوده (که این مورد به‌دلیل رنگدانه‌های طبیعی گزانتوفیل موجود در ذرت می‌باشد) که این مسئله نه تنها بر بازاریاب‌پسندی محصول نهایی مؤثر است بلکه بر سلامت پرنده، طراوت و ماندگاری خود جوجه‌ها نیز تأثیر مستقیم دارد (۱۲). بنابراین این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه عملکرد، پاسخ ایمنی و فراسنجه‌های هماتولوژیکی خون جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره‌های بدون کنجاله سویا (بر پایه ذرت و حاوی گلوتن) با مرغ تغذیه شده با جیره رایج (بر پایه ذرت-کنجاله سویا) در دوره پایانی پرورش از سن ۲۱ تا ۴۲ روزگی انجام شد.

مواد و روش‌ها

این آزمایش در ایستگاه تحقیقات طیور موسسه تحقیقات علوم دامی کشور انجام شد. در این پژوهش ۴۰۰ قطعه جوجه گوشتی سویه راس (به‌صورت مخلوط نر و ماده) خریداری شد، سپس تمام جوجه‌ها در شروع آزمایش به‌صورت دسته‌جمعی توزین و بر اساس

دوره پایانی پرورش از ۲۱ تا ۴۲ روزگی در قالب جیره آردی بودند. آزمایش از سن ۲۱ روزگی شروع و وزن ۲۱ روزگی به‌عنوان کوواریت در نظر گرفته شده شد. جیره غذایی مورد استفاده در آزمایش با توجه به ترکیبات مواد مغذی موجود در اقلام خوراکی موجود و برای تأمین احتیاجات مواد مغذی توصیه راس ۳۰۸ (سال ۲۰۱۹)، با استفاده از نرم‌افزار WUFFDA تنظیم شد (جدول ۱ و جدول ۲).

دامنه وزن‌های به‌دست آمده تا ۲۱ روزگی از جیره پایه آغازین و رشد حاوی ذرت-کنجاله سویا تغذیه شدند. سپس، در روز ۲۱ پرندگان در قالب طرح کاملاً تصادفی (به روش قرعه‌کشی) به ۲ تیمار با ۵ تکرار و ۴۰ پرنده در هر تکرار به واحدهای آزمایشی اختصاص یافتند. تیمارهای آزمایشی شامل: جیره فرموله شده بر پایه ذرت و فاقد کنجاله سویا و جیره متداول بر پایه ذرت-کنجاله سویا (شاهد) در

جدول ۱: ترکیب شیمیایی جیره‌های غذایی جوجه‌های گوشتی

Table 1. Chemical composition of broiler chicken diets

	جیره آغازین	جیره رشد	جیره پایانی (جیره بر پایه ذرت)
	Starter (0- 10d)	Grower (11- 20d)	Finisher (21- 42d)
Metabolizable energy (kcal/kg)	2880	2980	3020
Crude protein (%)	21.41	20.25	18.79
Calcium (%)	1.03	1.03	0.83
Sodium (%)	0.50	0.45	0.41
Available phosphorous (%)	0.14	0.14	0.14
Lysine (%)	1.18	1.03	0.97
Methionine+cysteine (%)	0.98	0.91	0.85
Threonine (%)	0.80	0.77	0.70

حاضر توسط یک شرکت فعال در زمینه تولید مکمل‌های تغذیه دام و طیور (شرکت کیمیا کاو بامداد) آماده‌سازی شد به طوری که جیره غذایی فاقد کنجاله سویا حاوی ذرت و گلوتن ذرت بود که یک منبع پروتئینی جایگزین حاوی پروتئین با کیفیت بالا و قابل هضم است و بر اساس نتایج آنالیز جیره دارای ۳۰۲۰ کیلوکالری انرژی قابل متابولیسم و ۱۸/۷۹ درصد پروتئین در دوره پایانی بود. احتیاجات آمینواسیدی پرندگان و سایر احتیاجات مواد مغذی براساس نیاز واقعی پرندگان در جیره تأمین شده بود. در جدول ۱ آنالیز جیره‌های آزمایشی مورد استفاده آمده است. پرندگان هر پن به‌صورت هفتگی در سنین ۲۱، ۲۸، ۳۵ و ۴۲ روزگی وزن‌کشی شدند و نیز میزان خوراک مصرفی، افزایش وزن بدن، ضریب تبدیل غذایی و درصد تلفات مورد بررسی قرار گرفت. برای ارزیابی خصوصیات لاشه در پایان دوره آزمایش از هر تکرار دو قطعه جوجه که وزن آن‌ها به متوسط وزن جوجه‌های هر واحد آزمایشی نزدیک‌تر بود انتخاب و بعد از اعمال ۸ ساعت گرسنگی به آن‌ها وزن‌کشی شده و ذبح شدند. مقادیر وزن سینه، ران‌ها، بال‌ها، تیره پشت (گردن تا دم)، کبد، پیش معده، سنگدان، طحال، بورس فابریسیوس، قلب، پانکراس، وزن و طول کل دستگاه گوارش و روده کوچک و وزن چربی محوطه شکمی با استفاده از ترازوی دیجیتالی با دقت ۰/۰۱ گرم اندازه‌گیری شدند. سپس با تقسیم وزن اندام‌های داخلی بر وزن زنده، وزن نسبی آن‌ها محاسبه می‌گردد. هم‌چنین وزن لاشه بعد از کشتار جوجه و جداسازی سر، پاها، برداشتن پوست و خالی کردن امعاء و احشاء از بدن به‌عنوان وزن لاشه در نظر گرفته شد، سپس با تقسیم اندام‌های مربوط به لاشه به وزن زنده، وزن نسبی آن‌ها به‌دست آمد (۱۳). برای بررسی

جدول ۲: اجزا و ترکیب جیره آزمایشی شاهد در دوره پایانی (۴۲-۲۱ روزگی)

Table 2. Ingredients and composition of the control experimental diet in finisher period (21-42d)

اقلام خوراکی	تیمار شاهد
Ingredients	Control
Corn	61.35
Soybean Meal (SBM)	33.75
Soy oil	1.87
Dicalcium phosphate	0.9
Limestone	1.10
Salt	0.27
NaHCO ₃	0.15
Vitamin and mineral permix ¹	0.50
L-lysine HCL	-
DL-Methionine	0.10
Metabolizable energy (kcal/kg)	3020
Crude protein (%)	18.79
Lysine (%)	1.00
Methionine+cysteine (%)	0.80
Calcium (%)	0.80
Available phosphorous (%)	0.40
Sodium (%)	0.15

¹ Premix provided: vitamin A: 9000 IU; vitamin D3: 2000 IU; vitamin E: 18 IU; vitamin K: 2.0 mg; ; vitamin B1: 1.8 mg vitamin B2: 6.6 mg; vitamin B6: 3 mg; vitamin B12: 15 mg; Niacin: 35 mg; Pantothenic acid: 10 mg; Folic acid: 1 mg; Choline: 500 mg. Mn: 75 mg; Fe: 50 mg; Zn: 85 mg; Cu: 10 mg; Se: 0.2 mg; and Iodine: 0.9 mg.

برنامه نوری شامل روشنایی ۲۴ ساعته در ۳ شبانه‌روز اول و ۲۳ ساعت روشنایی و ۱ ساعت تاریکی از روز چهارم تا پایان آزمایش بود. درجه حرارت و رطوبت محیط کنترل شده بود و تمام جوجه‌های گوشتی به‌صورت آزاد به خوراک و آب آشامیدنی دسترسی داشتند. تمام جوجه‌ها در شروع آزمایش به‌صورت دسته‌جمعی توزین و بر اساس دامنه وزن‌های به‌دست‌آمده تا ۲۱ روزگی از جیره پایه آغازین و رشد حاوی ذرت-کنجاله سویا تغذیه شدند. سپس جیره پروژه

نتایج

نتایج آزمایش استفاده از جیره مرغ ذرت بر صفات عملکرد جوجه‌های گوشتی از سن ۲۱ تا ۴۲ روزگی در جدول ۳ و ۴ آورده شده است. نتایج نشان داد که وزن زنده و میزان مصرف خوراک جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره مرغ ذرت در مقایسه با جیره شاهد پایین تر بود و اختلاف معنی‌داری را نشان داد ($P < 0.01$). هم چنین از لحاظ سایر صفات عملکرد پرنده شامل ضریب تبدیل خوراک و شاخص تولید در ۴۲ روزگی، پرندگان تغذیه شده با جیره شاهد (جیره معمول ذرت-کنجاله سویا) در مقایسه با جیره مرغ ذرت عملکرد بهتری داشتند ($P < 0.05$). هم چنین شاخص‌های اقتصادی عملکرد پرنده از جمله هزینه خوراک مصرفی به‌ازای هر کیلوگرم وزن زنده با مصرف جیره مرغ ذرت افزایش معنی‌داری داشت ($P < 0.05$). هم چنین در مورد درصد ماندگاری و تلفات گله نتایج نشان داد که استفاده از جیره مرغ ذرت در مقایسه با جیره شاهد اثرات منفی بر درصد ماندگاری و میزان تلفات گله از خود نشان نداد؛ با وجود این که این صفت از لحاظ آماری اختلاف معنی‌داری را در بین تیمارهای آزمایشی از خود نشان نداد ($P > 0.05$). نتایج آزمایش استفاده از جیره مرغ ذرت بر صفات لاشه و هم چنین وزن اندام‌های داخلی بدن جوجه‌های گوشتی در سن ۴۲ روزگی در جدول ۵ ارائه شده است. نتایج آزمایش نشان داد که از بین صفات لاشه پرنده، تنها راندمان سینه تحت تاثیر جیره‌های آزمایشی قرار گرفت؛ به طوری که جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره مرغ ذرت در مقایسه با جیره معمول کنجاله سویا-ذرت از لحاظ آماری راندمان سینه پایین تری داشتند ($P < 0.05$). هم چنین در خصوص نتایج حاصل از وزن اندام‌های داخلی بدن جوجه‌های گوشتی، به غیر از وزن نسبی چربی محوطه بطنی که اختلاف معنی‌داری را در بین تیمارهای آزمایشی نشان داد ($P < 0.05$)؛ هیچ کدام از وزن‌های نسبی اندام داخلی بدن شامل کبد، قلب، پانکراس، پیش معده و سنگدان اختلاف معنی‌داری از خود نشان ندادند ($P > 0.05$).

پاسخ های ایمنی گروه های آزمایشی واکسیناسیون مطابق توصیه دامپزشکی منطقه انجام شد و سپس به منظور بررسی میزان آنتی بادی تولید شده در پاسخ به واکسن نیوکاسل و آنفولانزا، در روز ۳۵ آزمایش، از هر تکرار (پن) ۲ قطعه پرنده انتخاب و از ورید بال خونگیری به عمل آمد. سپس، سرم خون جداسازی شد و با استفاده از روش مهار هم‌آگلوتیناسیون (HI)، میزان عیار پادتن بر علیه نیوکاسل و آنفولانزا اندازه گیری شد. هم چنین به منظور اندازه گیری فراسنجه‌های هماتولوژی در روز ۴۲ آزمایش، از هر تکرار دو قطعه جوجه انتخاب و عمل خونگیری از ورید بال انجام شد و خون های گرفته شده داخل شیشه های حاوی ماده ضد انعقاد EDTA ریخته و جهت بررسی میزان هموگلوبین، تعداد گلبول های قرمز، سفید و هماتوکریت مورد استفاده قرار گرفت. شمارش گلبول های قرمز و گلبول های سفید خون با استفاده از محلول نات - هریک با استفاده از روش هموسیتومتر انجام شد. به این منظور، ابتدا خون حاوی ماده ضد انعقاد توسط ملانژور گلبول سفید با محلول نات- هریک به نسبت ۱ به ۲۰ رقیق شد. یک قطره از این محلول حاوی گلبول سفید در مرکز لام هماسیتومتر ریخته و عمل شمارش در ۹ مربع بزرگی که در مرکز لام هستند، انجام و در نهایت تعداد گلبول های سفید به صورت ضریبی از 10^3 در هر میکرو لیتر خون بیان گردید (۱۴). هم چنین شمارش تفریقی اجزای مختلف گلبول های سفید خون شامل مونوسیت، لنفوسیت، هتروفیل، نسبت هتروفیل به لنفوسیت، ائوزینوفیل و بازوفیل با استفاده از میکروسکوپ نوری و با درشت نمایی ۱۰۰۰ انجام شد و مقادیر هماتوکریت و هموگلوبین نیز به ترتیب با استفاده از روش های میکروهماتوکریت و سیان مت هموگلوبین اندازه گیری شد (۱۵). این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۲ تیمار ۵ تکرار و ۴۰ پرنده در هر تکرار انجام گرفت. در مرحله اول داده های حاصل آزمایش در نرم افزار Excel وارد شد. سپس تجزیه و تحلیل کلیه داده های حاصل از این آزمایش با استفاده از نرم افزار SAS نسخه ۹/۱ و رویه GLM انجام شد. هم چنین میانگین تیمارها با استفاده از روش t-test در سطح احتمال ۵ درصد ($P < 0.05$) مقایسه شدند.

جدول ۳: اثرات استفاده از جیره مرغ ذرت بر وزن زنده و میزان مصرف خوراک جوجه‌های گوشتی از سن ۲۱ تا ۴۲ روزگی
Table 3. Effects of using corn-based diet on live weight and feed intake of broiler chickens from 21 to 42 days of age

صفات عملکرد Performance	وزن پرنده (۲۱ روزگی)	وزن پرنده (۲۸ روزگی)	وزن پرنده (۳۵ روزگی)	وزن پرنده (۴۲ روزگی)	مصرف خوراک (۲۱ روزگی)	مصرف خوراک (۳۵ روزگی)	مصرف خوراک (۴۲ روزگی)
Control	819 ^a	1329.20 ^a	1816.60 ^a	2273.90 ^a	1829.30 ^a	2993.60 ^a	3656.90 ^a
Corn-based	683.7 ^b	931.40 ^b	1282.90 ^b	1499.50 ^b	1324.90 ^b	2103.10 ^b	2681.60 ^b
SEM ¹	35.40	47.90	84.80	102.89	25.90	100.12	131.40
P-value	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001

^{a-b} میانگین های داخل هر سطر با حروف غیرمشابه دارای تفاوت معنی دار می باشند ($P < 0.05$).
Standard error of the means :SEM¹

جدول ۴: اثرات استفاده از جیره مرغ ذرت بر ضریب تبدیل خوراک (گرم/گرم) و شاخص‌های اقتصادی جوجه‌های گوشتی از ۲۱ تا ۴۲ روزگی

Table 4. Effects of using corn-based diet on feed conversion ratio (g/g), and economic indices of broilers from 21 to 42 days of age

صفات عملکرد Performance	ضریب تبدیل	ضریب تبدیل	ضریب تبدیل	میزان	شاخص تولید	هزینه خوراک مصرفی به
	خوراک	خوراک	خوراک	ماندگاری		ازای هر کیلوگرم وزن زنده
	(۲۸ روزگی)	(۳۵ روزگی)	(۴۲ روزگی)	(درصد)		(ریال)
Control	1.48	1.65	1.61 ^a	99.90	344.94 ^a	257664 ^b
Corn-based	1.53	1.64	1.79 ^b	99.98	205.10 ^b	280885 ^a
SEM ¹	0.055	0.095	0.065	0.68	10.84	2251.75
P-value	0.192	0.924	0.018	0.100	0.010	0.019

^{a-b} میانگین‌های داخل هر سطر با حروف غیرمشابه دارای تفاوت معنی‌دار می‌باشند ($P < 0.05$).

¹ SEM: Standard error of the means

جدول ۵: اثرات استفاده از جیره مرغ ذرت بر صفات لاشه و وزن اندام‌های داخلی جوجه‌های گوشتی در سن ۴۲ روزگی (درصدی از وزن زنده پرنده)

Table 5. Effects of using corn-based diet on carcass characteristics and internal organ weights of broiler chickens at 42 days of age (% of live weight)

صفات لاشه Carcass characteristics	بازده لاشه	بازده سینه	بازده ران	کبد	قلب	پانکراس	پیش معده	سنگدان	جربی محوطه بطنی
Control	73.17	29.38 ^a	21.68	2.32	0.49	0.237	0.427	1.48	1.68 ^a
Corn-based	72.34	25.26 ^b	21.99	2.49	0.53	0.187	0.532	1.66	1/05 ^b
SEM ¹	1.32	0.83	1.20	0.17	0.07	0.028	0.05	0.11	0.13
P-value	0.631	0.040	0.746	0.488	0.564	0.142	0.146	0.273	0.043

^{a-b} میانگین‌های داخل هر سطر با حروف غیرمشابه دارای تفاوت معنی‌دار می‌باشند ($P < 0.05$).

¹ SEM: Standard error of the means

ذرت و کنجاله سویا) و جیره مرغ ذرت هیچ کدام از فراسنجه‌های وزنی و طولی روده باریک جوجه‌های گوشتی را از لحاظ معنی‌داری آماری صفات مذکور تحت تاثیر قرار ندادند ($P > 0.05$).

نتایج آزمایش استفاده از جیره مرغ ذرت بر وزن و طول بخش‌های مختلف روده باریک شامل دئودنوم، ژژنوم و ایلئوم جوجه‌های گوشتی در سن ۴۲ روزگی در جدول ۶ ارائه شده است. نتایج آزمایش نشان داد که استفاده از جیره‌های آزمایشی شامل جیره شاهد (جیره حاوی

جدول ۶: اثرات استفاده از جیره مرغ ذرت بر وزن و طول نسبی روده باریک جوجه‌های گوشتی در سن ۴۲ روزگی

(درصدی از وزن زنده پرنده)

Table 6. Effects of using corn-based diet on the weight and relative length of the small intestine of broiler chickens at 42 days of age (% of live weight)

تیمارها Treatments	وزن روده باریک			طول روده باریک		
	دئودنوم	ژژنوم	ایلئوم	دئودنوم	ژژنوم	ایلئوم
Control	0.556	1.067	0.612	1.381	3.416	2.650
Corn-based	0.453	0.952	0.518	1.200	3.128	2.339
SEM ¹	0.068	0.131	0.070	0.156	0.502	0.231
P-value	0.15	0.41	0.31	0.26	0.60	0.23

¹ SEM: Standard error of the means

آنتی‌بادی بر علیه ویروس نیوکاسل و آنفلوانزا جوجه‌های گوشتی در سن ۳۵ روزگی نشان داد که استفاده از جیره مرغ ذرت و جیره معمول ذرت-کنجاله سویا به‌عنوان جیره شاهد تاثیر معنی‌داری بر پاسخ‌های تیتر آنتی‌بادی بر علیه این ۲ ویروس بیماری‌زا از خود نشان ندادند ($P > 0.05$).

نتایج آزمایش استفاده از جیره مرغ ذرت بر وزن نسبی اندام‌های ایمنی شامل بورس فابریسیوس و طحال در سن ۴۲ روزگی و همچنین عیار آنتی‌بادی بر علیه نیوکاسل و آنفلوانزا جوجه‌های گوشتی در جدول ۷ ارائه شده است. نتایج استفاده از جیره‌های آزمایشی بر وزن نسبی اندام‌های ایمنی شامل بورس و طحال از لحاظ آماری اختلاف معنی‌داری را نشان ندادند ($P > 0.05$). هم‌چنین نتایج حاصل از عیار

جدول ۷: اثرات استفاده از جیره مرغ ذرت بر وزن اندام‌های ایمنی و عیار آنتی‌بادی جوجه‌های گوشتی

Table 7. Effects of using corn-based diet on immune organ weight and antibody titer of broiler chickens

تیمارها Treatments	تیترا آنتی‌بادی (log ₂)		وزن اندام‌های ایمنی (درصدی از وزن زنده)	
	آنفلوانزا	نیوکاسل	طحال	بوس فابریسیوس
Control	4.50	7.25	0.122	0.202
Corn-based	3.75	7.25	0.147	0.229
SEM ¹	0.327	0.559	0.070	0.05
P-value	0.12	1.00	0.78	0.61

Standard error of the means. :SEM¹

به لنفوسیت تحت تأثیر جیره‌های آزمایشی قرار گرفتند (P<0/05). به طوری که تغذیه جوجه‌های گوشتی با جیره مرغ ذرت مقادیر گلبول‌های سفید و لنفوسیت‌های خون را افزایش و مقدار هموگلوبین خون را در مقایسه با جیره شاهد به طور معنی‌داری کاهش داد (P<0/05).

نتایج ارائه شده در جدول ۸ در مورد آزمایش فراسنج‌های هماتولوژیکی نشان داد که هیچ کدام از جیره‌های آزمایشی اثرات معنی‌داری بر مقادیر گلبول‌های قرمز، هماتوکریت، پلاکت‌ها، مونوسیت‌ها و ائوزینوفیل‌ها نداشتند (P>0/05). با این حال، مقادیر گلبول‌های سفید خون، هموگلوبین، هتروفیل‌ها و لنفوسیت‌ها و نسبت هتروفیل

جدول ۸: اثرات استفاده از جیره مرغ ذرت بر شاخص‌های هماتولوژیکی خون جوجه‌های گوشتی در سن ۴۲ روزگی

Table 8. Effects of using corn-based diet on hematological blood indices of broiler chickens at 42 days of age

تیمارها Treatments	گلبول قرمز (μL)	گلبول سفید (μL)	هموگلوبین (g/dL)	هماتوکریت (%)	مونوسیت (%)	ائوزینوفیل (%)	پلاکت‌ها (%)	هتروفیل (%)	لنفوسیت (%)	لنفوسیت/هتروفیل
Control	26000	2.20 ^a	8.30 ^a	28.95	5.75	4.00	27.75	27.75 ^a	62.50 ^b	0.445 ^a
Corn-based	25800	2.52 ^b	7.26 ^b	28.10	4.80	3.40	29.80	25.00 ^b	66.80 ^a	0.375 ^b
SEM ¹	3193	0.06	0.256	1.54	1.71	1.34	3.56	0.725	0.627	0.016
P-value	0.92	0.04	0.04	0.39	0.40	0.50	0.40	0.03	0.01	0.03

^{a-b} میانگین‌های داخل هر سطر با حروف غیرمشابه دارای تفاوت معنی‌دار می‌باشند (P<0/05).

Standard error of the means :SEM¹

بحث

مواد مغذی را افزایش می‌دهد. به علاوه، به دلیل تعادل مناسب مواد مغذی، جیره ذرت-کنجاله سویا می‌تواند منجر به افزایش وزن سریع‌تر و بهبود ضریب تبدیل غذایی (میزان غذایی که برای تولید یک کیلوگرم وزن زنده مصرف می‌شود) در جوجه‌های گوشتی شود (۱۶). با این حال، در برخی موارد استفاده از جیره‌های حاوی سویای بالا ممکن است هزینه‌های تولید را افزایش دهد که در این صورت استفاده از منابع جایگزین پروتئین و انرژی به جای سویا علاوه بر کاهش هزینه‌های تولید می‌تواند به تنوع در جیره غذایی و کاهش وابستگی به یک منبع خاص منجر شود. مشابه آزمایش حاضر، مکمل کردن جیره‌های جوجه‌های گوشتی با منابع پروتئینی غیر از سویا ممکن است الگوی اسیدآمینه متفاوتی را در جیره ایجاد کند. بنابراین دلیل اصلی کاهش عملکرد پرندگان با منابع پروتئینی غیر از کنجاله سویا عدم تعادل آمینواسیدهای جیره غذایی و کاهش ارزش بیولوژیکی پروتئین مصرفی جایگزین می‌باشد (۱۷). از سوی دیگر، ترکیبات مفید موجود در کنجاله سویا هم چون الیگوساکاریدها و فیبرهای خاص در مقدار مناسب می‌توانند به رشد پروبیوتیک‌ها و باکتری‌های مفید روده‌ای مانند لاکتوباسیلوس و بیفیدوباکتریوم کمک کنند و باعث تعادل بهتر

جیره ذرت-کنجاله سویا به دلیل داشتن تعادل مناسبی از پروتئین و انرژی، به طور کلی برای جوجه‌های گوشتی مفید است و در مقایسه با جیره‌های حاوی سویا کم‌تر، مزایایی دارد. با این حال، برخی از جیره‌های با سویای پایین‌تر نیز می‌توانند برای اهداف خاصی مناسب باشند، اما به طور کلی، جیره ذرت-کنجاله سویا به دلیل فراهم کردن مواد مغذی ضروری برای رشد و سلامت جوجه‌ها، برتری دارد. کنجاله سویا به عنوان منبع عالی پروتئین دارای ۴۴ تا ۴۸ درصد پروتئین خام با کیفیت بالا و اسیدهای آمینه ضروری مانند لیزین، متیونین و ترئونین است و ذرت منبع خوبی برای تامین انرژی در جیره غذایی است. این دو ماده در کنار هم، تعادل مناسبی از این دو ماده مغذی ضروری را برای رشد و نمو بهینه جوجه‌های گوشتی فراهم می‌کنند. کنجاله سویا حاوی طیف وسیعی از اسیدهای آمینه ضروری مانند لیزین است که برای رشد عضلانی، تقویت سیستم ایمنی و بهبود عملکرد کلی جوجه‌ها حیاتی است. هم‌چنین فیبر موجود در کنجاله سویا به بهبود عملکرد دستگاه گوارش جوجه‌ها کمک می‌کند و جذب

خوراک (از جمله اندازه و شکل ذرات و ترکیبات آن، بافت خوراک از لحاظ قابلیت هضم آن)، میزان دسترسی به خوراک و آب، و کیفیت آب مصرفی هستند. همچنین عوامل مدیریتی شامل تراکم گله، استرس، بهداشت سالن و تهویه نیز بر رشد و طول روده باریک تاثیرگذار هستند (۲۳). در آزمایش حاضر با توجه به این که تمام شرایط کنترل شده بود و جیره‌های مصرفی از لحاظ قابلیت هضم پرنده جزو جیره‌های مرسوم و قابل دسترس برای پرنده محسوب می‌شوند بنابراین وزن و طول روده باریک تحت تاثیر عوامل تغذیه‌ای و مدیریتی قرار نگرفتند و بین تیمارهای آزمایش اختلاف معنی‌داری در این خصوص مشاهده نگردید. باوجود عدم اختلاف معنی‌دار بین وزن اندام‌های ایمنی جوجه‌های گوشتی آزمایش حاضر، ولی به‌نظر می‌رسد افزایش وزن اندام‌های ایمنی پرنده با مصرف جیره مرغ ذرت شامل دانه ذرت و خوراک گلوتن ذرت به‌عنوان یک عامل تنش‌زا عمل کرده و در مقایسه با جیره معمول کنجاله سویا-ذرت باعث افزایش وزن عددی این اندام‌ها شده است. اندام‌های اصلی ایمنی در طیور شامل تیموس، طحال و بورس فابریسیوس هستند. به‌دنبال پاسخ ایمنی در پرنده، لنفوسیت‌های بالغ و سایر سلول‌های ایمنی مستقر در اندام‌های لنفاوی بدن در صدد مقابله با عوامل خارجی یا همان آنتی‌ژن‌ها بر می‌آیند. در نتیجه، حجم و وضعیت سلولی این اندام‌های ایمنی معمولاً می‌تواند نشان‌دهنده وضعیت ایمنولوژیکی بدن پرنده باشد؛ به‌طوری که افزایش وزن اندام‌های ایمنی بدن در اثر تکثیر سلول‌های لنفوسیت ایجاد می‌شود نشان‌دهنده بهبود پاسخ‌های ایمنی پرنده است (۲۴). برخلاف نتایج آزمایش حاضر، Nabipour Afrouzi و همکاران، گزارش کردند که استفاده از ۴ تا ۸ درصد کنجاله گلوتن ذرت فرآوری شده با آنزیم در جیره جوجه‌های گوشتی با افزایش IgG پاسخ ایمنی همورال جوجه‌ها را بهبود بخشید (۲۵). کنجاله گلوتن ذرت حاوی ترکیبات کاتونئیدی و ویتامین E می‌باشد که دارای خواص آنتی‌اکسیدانی بوده و می‌توانند سیستم ایمنی بدن را از آسیب اکسیداتیو محافظت کنند و پاسخ‌های ایمنی بدن را بهبود بخشند (۲۶). ثابت شده است که بالا رفتن گلبول‌های سفید و پایین آمدن هموگلوبین خون در بدن پرنده می‌تواند نشان‌دهنده مشکلات سلامتی، از جمله کم‌خونی، وجود تنش، عفونت و التهاب باشد (۲۷). در آزمایش حاضر نیز استفاده از جیره غذایی بدون منبع کنجاله سویا (جیره مرغ ذرت) به دلیل کمبودهای ناشی از مواد مغذی از جمله مواد معدنی پرنیز و کم‌نیاز از جمله کلسیم، فسفر، منیزیم، پتاسیم، آهن و روی و هم‌چنین ویتامین‌های گروه B که در متابولیسم انرژی و سلامت پرنده نقش عمده‌ای را ایفا می‌کنند می‌تواند باعث کاهش عملکرد پرنده و بروز التهاب و تنش در پرنده گردد (۲۸). افزون بر این، نسبت هتروفیل به لنفوسیت که یکی از شاخص‌های مناسب برای ارزیابی تنش و

فلور گوارشی شوند. در نتیجه، دستگاه گوارشی پرنده بهبود یافته، مواد مغذی موجود در خوراک راحت‌تر جذب بدن می‌شوند (۱۸). افزون بر این در پژوهش حاضر، استفاده از جیره فاقد کنجاله سویا سبب افزایش معنی‌دار هزینه خوراک مصرفی به ازای هر کیلوگرم وزن زنده شد که این امر نه تنها می‌تواند با افزایش هزینه‌های تامین جیره مرغ ذرت (جیره بر پایه خوراک و کنجاله گلوتن ذرت) مرتبط باشد بلکه کاهش عملکرد (ضریب تبدیل خوراک) مشاهده شده در تیمار آزمایشی مرغ ذرت نیز می‌تواند هزینه خوراک مصرفی به ازای هر کیلوگرم وزن زنده را افزایش دهد. جیره غذایی حاوی کنجاله سویا و ذرت به دلیل محتوای بالای پروتئین و انرژی، به رشد ماهیچه‌های سینه در جوجه‌های گوشتی کمک می‌کند. پروتئین کنجاله سویا، منبعی غنی از اسیدهای آمینه ضروری از جمله لیزین، متیونین، تریپتوفان و ترئونین است که برای رشد عضله سینه و عضله ران ضروری هستند، این امر منجر به افزایش وزن و بهبود کیفیت لاشه جوجه‌ها می‌شود (۱۹). ذرت نیز انرژی لازم برای فعالیت‌های متابولیکی و رشد را فراهم می‌کند. این ترکیب غذایی به افزایش وزن بدن، بهبود ضریب تبدیل غذایی و تقویت عضلات، به ویژه ماهیچه سینه، کمک می‌کند. از سوی دیگر تعادل اسیدهای آمینه ضروری موجود در کنجاله سویا از جمله اسیدهای آمینه شاخه‌دار (لوسین، ایزولوسین و والین) که برای سنتز پروتئین عضلانی ضروری هستند به رشد و ترمیم ماهیچه‌ها کمک می‌کنند. بنابراین کنجاله سویا می‌تواند به‌طور موثری از طریق تاثیر بر عوامل دخیل در بهبود سلامت روده‌ای و جذب مواد مغذی بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی مؤثر باشد (۲۰). نتایج حاصل از وزن نسبی چربی محوطه بطنی نشان داد که پرندگان تغذیه شده با جیره مرغ ذرت در مقایسه با جیره شاهد چربی بطنی پایین‌تری در پایان آزمایش داشتند، که این مسئله مهم می‌تواند در بهبود کیفیت محصول نهایی مفید و مؤثر باشد. وزن بدن و وزن لاشه تاثیر مستقیمی بر چربی محوطه بطنی دارد و هرچقدر وزن لاشه کم‌تر باشد چربی محوطه بطنی بالطبع کم‌تر خواهد بود (۲۱). در آزمایش حاضر جوجه‌هایی که جیره مرغ ذرت را دریافت کرده بودند در مقایسه با پرندگان تغذیه شده با جیره شاهد وزن بدن کم‌تری داشتند که این مسئله باعث کاهش وزن نسبی چربی بطنی در این جوجه‌ها گردید و این مسئله می‌تواند در بهبود کیفیت لاشه و سلامت پرنده مؤثر باشد. از سوی دیگر تجمع بیش از حد چربی محوطه بطنی منجر به کاهش راندمان خوراک می‌شود، زیرا در مقایسه با همان مقدار ماهیچه، تجمع همان مقدار چربی ۳ تا ۵ برابر هزینه خوراک را به شدت افزایش می‌دهد (۲۲). وزن و طول روده باریک جوجه‌های گوشتی بیش‌تر تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله عوامل تغذیه‌ای، مدیریتی و ژنتیکی قرار داد. عوامل تغذیه‌ای شامل ترکیب

- Journal of Veterinary and Animal Science*. 45(6): 1041-1051. <https://doi.org/10.3906/vet-2104-80>
2. **Fahimi, S., Dastar, B., Ashayerizadeh, O. and Mirshekar, R., 2024.** The effect of raw and fermented rapeseed meal on performance, carcass, and morphology of intestinal villi in broiler chickens under normal rearing conditions and ascites induction. *Journal of Animal Environment*. 15(4): 153-162. doi: 10.22034/AEJ.2023.378987.2921 (In Persian)
 3. **NRC. 1994.** Nutrient requirements of poultry, 9th rev. ed. National Academic Science, Washington, DC, USA.
 4. **Cowieson, A.J., 2005.** Factors that affect the nutritional value of maize for broilers. *Animal Feed Science and Technology*. 119: 293-305. doi: 10.1016/j.anifeedsci.2004.12.017
 5. **Williams, M.P., O'Neill, H.V.M., York, T. and Lee, J.T., 2018.** Effects of nutrient variability in corn and xylanase inclusion on broiler performance, nutrient utilisation, and volatile fatty acid profiles. *Journal of Applied Animal Nutrition*. 6: e1. doi: <https://doi.org/10.1017/jan.2017.11>
 6. **Huart, F., Malumba, P., Béra, F. and Beckers, Y., 2020.** The drying temperature and the moisture content at harvest affect the apparent metabolisable energy of two maize varieties in broiler chickens. *British Poultry Science*. 61: 684-694. doi: 10.1080/00071668.2020.1784847
 7. **Kim, S.K., 2013.** Marine Proteins and Peptides: *Biological Activities and Applications*. John Wiley & Sons, Ltd. doi: 10.1002/9781118375082
 8. **Funaba, M., Oka, Y., Kobayashi, S., Keneko, M., Yamamoto, H. and Namikawa, K., 2005.** Evaluation of meat meal, chicken meal, and corn gluten meal as dietary sources of protein in dry cat food. *Canadian Journal of Veterinary Research*. 69(4): 299-304.
 9. **Giannenas, I., Bonos, E., Anestis, V., Filioussis, G., Papanastasiou, D.K. and Bartzanas, T., 2017.** Effects of protease addition and replacement of soybean meal by corn gluten meal on the growth of broilers and on the environmental performances of a broiler production system in Greece. *PLoS ONE*. 12(1): e0169511. doi: 10.1371/journal.pone.0169511

کارایی سطح ایمنی بدن پرنده محسوب می‌شود در جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره مرغ ذرت در مقایسه با جیره شاهد به طور معنی‌داری کم‌تر بود ($P < 0/05$). عوامل تنش‌زا در طیور معمولاً باعث افزایش شمار هتروفیل‌ها و کاهش شمار لنفوسیت‌ها می‌شوند (۱۴). از سوی دیگر، گزارش شده است که پروتئین‌های موجود در ذرت و خوراک گلوتن ذرت به‌ویژه پپتیدهای زئین گلوتن ذرت دارای نقش آنتی‌اکسیدانی قوی می‌باشند (۲۹). افزون بر این مقادیر بالای ویتامین E و رنگدانه‌های گزانتوفیلی موجود در گلوتن ذرت به‌عنوان آنتی‌اکسیدان طبیعی بدن موجب تحریک سیستم ایمنی و بهبود سلامت عمومی پرنده می‌شوند (۳۰). بنابراین به‌طور کلی می‌توان گفت با وجود آن‌که ذرت و خوراک گلوتن و کنجاله گلوتن ذرت منابع نسبتاً خوبی از مواد معدنی و ویتامین‌های آنتی‌اکسیدانی از جمله روی، سلنیوم، منگنز و هم‌چنین ویتامین‌های گروه A، E و B برای جوجه‌های گوشتی هستند که به تقویت سیستم ایمنی، بهبود عملکرد و سلامت کلی جوجه‌ها کمک می‌کنند، ولی در مقایسه با جیره ایده آل و مرسوم کنجاله سویا-ذرت به‌دلیل داشتن کمبودهای تغذیه‌ای و هم‌تعادل مناسب مواد مغذی جیره سیستم ایمنی پرنده را تضعیف کرده و نیازهای پرنده در زمان بروز تنش‌های اکسیداتیو و تقویت سیستم ایمنی برای مقابله برای بیماری‌ها به میزان کافی تامین نمی‌شود. نتایج این مطالعه نشان داد که تغذیه جوجه‌های گوشتی در دوره پایانی پرورش از ۲۱ تا ۴۲ روزگی با جیره‌های حاوی مرغ ذرت (بر پایه گلوتن ذرت) عملکرد تولیدی پرنده را در مقایسه با جیره مرسوم کنجاله سویا-ذرت به‌طور معنی‌داری کاهش داد و نمی‌تواند جایگزین مناسبی برای کنجاله سویا باشد. با این حال، استفاده از جیره مرغ ذرت با وجود کمبودهای تغذیه‌ای، با افزایش شمار لنفوسیت‌ها و کاهش هتروفیل‌ها و کاهش شاخص ایمنولوژیکی هتروفیل به لنفوسیت توانست سیستم ایمنی پرنده را در مقایسه با جیره شاهد (کنجاله سویا-ذرت) بهبود بخشد.

تشکر و قدردانی

بدین‌وسیله از شرکت کیمیا کاو بامداد و مؤسسه تحقیقات علوم دامی برای پشتیبانی از اجرای این پژوهش سپاسگزاری می‌شود.

منابع

1. **Shaviklo, A., Alizadeh Ghamsari, A., Etemadian, Y. and Rafipour, F., 2021.** The effects of dietary fish protein hydrolysate-based supplementation on sensory properties and meat quality of broiler chicken. *Turkish*

19. **Ravindran, V., Abdollahi, M.R. and Bootwalla, S.M., 2014.** Nutrient analysis, metabolizable energy, and digestible amino acids of soybean meals of different origins for broilers. *Poultry Science*. 93: 2567-2577. <https://doi.org/10.3382/ps.2014-04068>
20. **Goo, D., Lee, J. and Paneru, D., 2024.** Effects of branched-chain amino acid imbalance and dietary valine and isoleucine supplementation in modified corn-soybean meal diets with corn distillers dried grains with soluble on growth performance, carcass quality, intestinal health, and cecal microbiome in Cobb 500. *Poultry Science*. 103(12): 104483. doi: 10.1016/j.psj.2024.104483
21. **Chen, J.T., He, P.G., Jiang, J.S., Yang, Y.F., Wang, S.Y., Pan, C.H., Zeng, L., He, Y.F., Chen, Z.H. and Lin, H.J., 2023.** In vivo prediction of abdominal fat and breast muscle in broiler chicken using live body measurements based on machine learning. *Poultry Science*. 102: 102239. doi: 10.1016/j.psj.2022.102239
22. **Melot, J.E., Motter, M.M., Morao, L.R., Huguet, M.J., Canet, Z. and Miquel, M.C., 2003.** Use of in-vivo measurements to estimate breast and abdominal fat content of a free-range broiler strain. *Animal Science*. 77: 23-31. doi: 10.1017/S1357729800053613
23. **Zaefarian, F., Abdollahi, M. and Ravindran, V., 2016.** Particle size and feed form in broiler diets: impact on gastrointestinal tract development and gut health. *World's Poultry Science Journal*. 72(2): 277-290. doi: 10.1017/S0043933916000222
24. **Smith, K.G. and Hunt, J.L., 2004.** On the use of spleen mass as a measure of avian immune system. *Oecologia*. 138: 28-31. doi: 10.1007/s00442-003-1409-y
25. **Nabipour Afrouzi, H., Torbatinejad, N., Shams Shargh, M. and Rezaei, M., 2019.** Effects of different levels of corn gluten meal without processing and processed with protease enzyme on performance, some blood biochemical parameters, immunity and microbial population in broiler chickens. *Animal Science Journal*. 32: 291-310. <https://doi.org/10.22092/asj.2018.121593>. 1685 (In Persian)
26. **Zhao, Y., Deng, Y., Guo, T., Wu, H., Lv, T. and Liu, X., 2024.** Antioxidant capacity of fermented corn gluten meal in broiler chickens: a solid-state approach with
10. **Savage, J.H., Kaeding, A.J., Matsui, E.C. and Wood, R.A., 2010.** The natural history of soy allergy. *Journal of Allergy and Clinical Immunology*. 125: 683-686. doi: 10.1016/j.jaci.2009.12.994
11. **Brown, S.N., Nute, G.R., Baker, A., Hughes, S.I. and Warriss, P.D., 2008.** Aspects of meat and eating quality of broiler chickens reared under standard, maize-fed, free range or organic systems. *British Poultry Science*. 49: 118-124. doi: 10.1080/00071660801938833
12. **Sunde, M.L., 1992.** Introduction to the symposium: The scientific way to pigment poultry products. *Poultry Science*. 71: 709-710. doi: 10.3382/ps.0710709
13. **Amiri, A., Daneshyar, M. and BehrouzLak, M.A., 2021.** Effect of different levels of peppermint and rosemary herbal powder mixture on performance, carcass characteristics and some blood parameters of Japanese quails challenged with dexamethasone. *Journal of Animal Environment*. 13(2): 169-178. doi: 10.22034/aej.2020.136663 (In Persian)
14. **Campbell, T.W., 1995.** Avian Haematology and Cytology. Iowa State University Press, USA.
15. **Kececi, O., Oguz, H., Kurtoglu, V. and Demet, O., 1998.** Effects of polyvinylpyrrolidone, synthetic zeolite and bentonite on serum biochemical and haematological characters of broiler chickens during aflatoxicosis. *British Poultry Science*. 39: 452-458. <https://doi.org/10.1080/00071669889051>
16. **Husak, R.L., Sebranek, J.G. and Bregendahl, K., 2008.** A survey of commercially available broilers marketed as organic, pasture-raised, and conventional broilers for cooked meat yields, meat composition, and relative value. *Poultry Science*. 87: 2367-2376. doi: 10.3382/ps.2007-00294
17. **Beski, S.S.M., Swick, R.A. and Iji, P.A., 2015.** Specialized protein products in broiler chicken nutrition: a review. *Animal Nutrition*. 1: 47-53. <https://doi.org/10.1016/j.aninu.2015.05.005>
18. **Baker, K., Utterback, P., Parsons, C. and Stein, H., 2011.** Nutritional value of soybean meal produced from conventional, high-protein, or low-oligosaccharide varieties of soybeans and fed to broiler chicks. *Poultry Science*. 90: 390e5. doi: 10.3382/ps.2010-00978

- mixed microbial fermentation. *Poultry Science*. 103: 104318. doi: 10.1016/j.psj.2024.104318
27. **Campbell, T.W. and Ellis, C.K., 2007.** Avian and Exotic Animal Hematology and Cytology, 3rd edn. Blackwell Publishing, USA.
28. **Witkowska, Z., Chojnacka, K., Korczyński, M., Świniarska, M., Saeid, A., Opaliński, S. and Dobrzański, Z., 2014.** Soybean meal enriched with microelements by biosorption-a new biological feed supplement for laying hens. Part I. Performance and egg traits. *Food Chemistry*. 151: 86-92. doi: 10.1016/j.foodchem.2013.11.023
29. **Zhu, L., Chen, J., Tang, X. and Xiong, Y.L., 2008.** Reducing, radical scavenging, and chelation properties of in vitro digests of Alcalase-treated zein hydrolysate. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*. 56: 2714-2721. doi: 10.1021/jf801328j
30. **Shin, H.S., Kim, J.W., Kim, J.H., Lee, D.G., Lee, S. and Kil, D.Y., 2016.** Effect of feeding duration of diets containing corn distillers dried grains with solubles on productive performance, egg quality, and lutein and zeaxanthin concentrations of egg yolk in laying hens. *Poultry Science*. 95: 2366-2371. doi: 10.3382/ps/pew127